

# SCHEMA TECNICA

## MUSKIL® FORABLOCK



AUTORIZZAZIONE BIOCIDA IT/2013/00173/MRA

### Esca rodenticida in blocco paraffinato a base di Bromadiolone e Difenacoum

MUSKIL® FORABLOCK è un rodenticida bi-componente brevettato (Brevetto Europeo n.2090164B di Zapi SpA) che associa due principi attivi anticoagulanti di seconda generazione (Bromadiolone e Difenacoum) per conferire al prodotto maggiore velocità di avvelenamento nei confronti di topi e ratti. Infatti, la morte dei roditori avviene normalmente tra i 3 ed i 5 giorni dopo la prima ingestione, permettendo il controllo dell'infestazione senza destare alcun sospetto verso l'esca da parte degli altri componenti della colonia. L'associazione brevettata dei due principi attivi rende MUSKIL® FORABLOCK efficace anche nei confronti dei roditori resistenti agli anticoagulanti attivi per ingestione multipla, aiutando anche a ridurre il rischio di sviluppo di possibili resistenze.

MUSKIL® FORABLOCK è un'esca rodenticida costituita da un mix di cereali interi e spezzati, farine, frutta secca e paraffina alimentare. È costituita da blocchetti di colore rosso e dalla forma rettangolare con foro centrale, per permettere al blocco di essere fissato in maniera stabile. Inoltre, i particolari rilievi realizzati sui lati, stimolano il naturale comportamento dei roditori a rosicchiare. L'esca MUSKIL® FORABLOCK è ottenuta per estrusione a freddo, tecnologia che permette di realizzare esche in blocchetti di varie forme e grammatura caratterizzati da un basso contenuto di paraffina, un ricco assortimento di sostanze adescanti con alta appetibilità ed elevata stabilità anche in condizioni climatiche avverse. Il prodotto contiene anche una sostanza amaricante (Denatonio Benzoato) atta a ridurre il rischio di ingestione accidentale da parte di persone, in particolare bambini, animali domestici e non target; l'antidoto (Vitamina K1) risulta di facile reperibilità.

MUSKIL® FORABLOCK può essere utilizzato per contrastare infestazioni murine in ambienti domestici, civili, industriali e zootecnici, esterni ed interni.

Prodotto ad uso specifico di professionale specializzato.

#### FORMULAZIONE

Blocco paraffinato estruso

#### COMPOSIZIONE

Bromadiolone puro 0,0025%, Difenacoum puro 0,0025%, Denatonio Benzoato 0,001%

Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull'etichetta del prodotto. Pertanto chi impiega il prodotto è tenuto a leggere e ad attenersi a quanto riportato in etichetta. PESTNET ITALIA srl declina ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma. Prima dell'uso si consiglia di effettuare una prova per testare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare.

**PESTNET**

PESTNET ITALIA srl,  
Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (PD)  
Tel. 049|9500588  
[www.pestnet-europe.it](http://www.pestnet-europe.it)

## MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO

Le esche rodenticide contenenti sostanze attive anticoagulanti (AVK) sono destinate ad un uso non permanente e in un'ottica di gestione integrata delle infestazioni. Nel caso in cui l'infestazione non sia completamente debellata nell'arco dei 35 giorni previsti dalla norma vigente, è tuttavia possibile per il professionista formato considerare un riutilizzo reiterato nel tempo delle esche rodenticide, in tutti quei luoghi con un elevato potenziale di re-invasione e qualora altri metodi di controllo si siano rivelati insufficienti.

## DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Per un appropriato controllo delle infestazioni, attenersi alle seguenti fasi di trattamento:

### 1. Sopralluogo dell'area e pre-trattamento

Prima di posizionare le esche, procedere ad un sopralluogo dell'area per stabilire la specie di roditori, il livello e l'estensione dell'infestazione ed individuare tutti i punti di accesso, le tane, i luoghi di alimentazione, ecc. Per minimizzare l'uso di esche rodenticide, in particolare per derattizzazioni di aree sensibili (ad es. industrie alimentari, magazzini di granaglie e ricoveri di animali), è consigliabile l'uso preventivo di esche non avvelenate (esche placebo o virtuali).

### 2. Trattamento

Durante le operazioni di caricamento e pulizia delle esche usare guanti protettivi. Disporre le esche in adeguati contenitori a prova di manomissione dove vi siano segni di presenza dei roditori, come ad esempio nei pressi di tane, lungo i loro camminamenti e punti d'alimentazione. Accertarsi sempre che le esche siano adeguatamente protette dai bambini e dagli animali non bersaglio, come animali domestici o uccelli.

Dosi di utilizzo.

- **Infestazioni da ratti**

Utilizzare per ogni punto esca fino a 100 g ogni 10 metri, riducendo tale spazio a 5 metri in caso di forti infestazioni

- **Infestazioni da topi**

Utilizzare per ogni punto esca fino a 50 g ogni 5 metri, riducendo tale spazio a 2 metri in caso di forti infestazioni.

## CONFEZIONI DI VENDITA

MUSKIL® FORABLOCK è disponibile in tre versioni:

- MUSKIL® FORABLOCK MINI  
Blocchi con foro centrale da 10g, in secchio da 10 kg
- MUSKIL® FORABLOCK  
Blocchi con foro centrale da 25g, in secchio da 10 kg
- MUSKIL® FORABLOCK MAXI  
Blocchi con foro centrale da 100g, in secchio da 5 kg



Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull'etichetta del prodotto. Pertanto chi impiega il prodotto è tenuto a leggere e ad attenersi a quanto riportato in etichetta. PESTNET ITALIA srl declina ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma. Prima dell'uso si consiglia di effettuare una prova per testare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare.

**PESTNET**

PESTNET ITALIA srl,  
Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (PD)  
Tel. 049/9500588  
[www.pestnet-europe.it](http://www.pestnet-europe.it)