

SCHEMA TECNICA



NEPOREX 2 WDG

PMC 14566

Larvicida mosche

Neporex 2 WDG è un larvicida in granuli idrosolubili, indicato per la lotta contro le larve di tutte le specie di mosche. Contiene la Ciromazina, principio attivo appartenente al gruppo delle triazine che regolarizza la crescita degli insetti (IGR, Insect Growth Regulator): agendo sul metabolismo dell'acido nucleico, interferisce con il processo di muta delle larve interrompendo il normale sviluppo delle pupe. Le larve, per effetto della Ciromazina, non riescono a sintetizzare la cuticola epidermica chitinosa e di conseguenza muoiono durante lo sviluppo.

Neporex 2 WDG svolge un'azione "selettiva" perché agisce solo sulle larve di ditteri salvaguardando gli insetti utili (coleotteri, imenotteri).

Il prodotto è stato concepito per essere utilizzato prevalentemente in ambienti con accumuli di materia organica, dove le mosche si posano indisturbate per deporre le uova:

- punti dove il calpestio degli animali è limitato (corsie, angoli e perimetro dei box)
- sotto mangiatoie ed abbeveratoi
- alla base di colonne e pilastri
- fosse profonde e concimaie in ambienti zootecnici
- discariche

FORMULAZIONE

WDG - Microgranuli idrosolubili

COMPOSIZIONE

Ciromazina 2%

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

NEPOREX 2WDG, interferendo sullo sviluppo delle larve, deve essere applicato esclusivamente nei luoghi di possibile riproduzione delle mosche. Può essere applicato nei tre seguenti modi, avendo cura di distribuire il prodotto sulla superficie da trattare nel modo più uniforme possibile:

Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull'etichetta del prodotto. Pertanto chi impiega il prodotto è tenuto a leggere e ad attenersi a quanto riportato in etichetta. PESTNET ITALIA srl declina ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma. Prima dell'uso si consiglia di effettuare una prova per testare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare.

PESTNET

PESTNET ITALIA srl,
Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (PD)
Tel. 049|9500588
www.pestnet-europe.it

- A spaglio (indicato solo per substrati umidi): utilizzare 250 g di prodotto pronto uso per una superficie di 10 m²;
- A spray (indicato per substrati sia umidi che asciutti): utilizzare 250 g di prodotto da diluire in 1-4 litri di acqua per una superficie di 10 m²;
- Per irrorazione (indicato per substrati sia umidi che asciutti): utilizzare 250 g di prodotto da diluire in 10 litri di acqua, per una superficie di 10 m².

Per una corretta applicazione, osserva i seguenti accorgimenti:

- In presenza di materia organica asciutta: utilizzare Neporex sciolto in acqua
- In presenza di materia organica umida o fosse liquami: utilizzare Neporex tal quale "a secco" o sciolto in acqua
- Nel caso dei grigliati: applicare Neporex su tutta la superficie.

Per una maggiore efficacia, si consiglia di effettuare una prima applicazione di Neporex a febbraio-marzo e di ripetere il trattamento

- 1-2 giorni dopo aver rifatto le lettiere o aver allontanato liquami e letame
- Dopo la prima comparsa delle mosche e non oltre l'accumulo di 15-20 cm di nuovo materiale organico
- Una volta al mese all'inizio della stagione, poi ogni 2-3 settimane, a seconda della ricomparsa del livello di infestazione, della temperatura ambientale, dell'umidità del substrato, dello spessore accumulato del materiale organico e della frequenza di allontanamento dello stesso dagli animali.

Il prodotto va applicato nelle lettiere di bovini, ovicaprini, suini ed equini lo sviluppo delle larve di mosca avviene prevalentemente nelle aree non calpestate dagli animali (soprattutto se trattasi di animali pesanti), pertanto l'applicazione di NEPOREX 2WDG deve essere opportunamente effettuata lungo le pareti, i divisori dei box, in corrispondenza di abbeveratoi, mangiatoie, angoli, colonne, su una fascia di circa 50 cm di larghezza. Nelle lettiere di avicoli l'applicazione di NEPOREX 2WDG deve avvenire in corrispondenza delle aree umide (es. attorno agli abbeveratoi) in fasce o cerchi di circa 50 - 70 cm di ampiezza. In caso di accumuli di deiezioni sotto gabbie e grigliati, applicare il prodotto sull'intera superficie del grigliato o dei reflui esposti, in modo da distribuire il prodotto uniformemente sui reflui stessi.

Si raccomanda di effettuare il trattamento in assenza di animali e di non trattare mangimi, bevande o recipienti destinati a contenerli. Subito dopo aver effettuato il trattamento delle superfici ed areato gli ambienti, gli animali potranno essere riammessi nel loro habitat.

CONFEZIONI DI VENDITA

Cartone da 20 kg



Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull'etichetta del prodotto. Pertanto chi impiega il prodotto è tenuto a leggere e ad attenersi a quanto riportato in etichetta. PESTNET ITALIA srl declina ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma. Prima dell'uso si consiglia di effettuare una prova per testare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare.

PestNET

PESTNET ITALIA srl,
Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (PD)
Tel. 049/9500588
www.pestnet-europe.it