

# BONITOP BLOCK PLUS



Autorizzazione Biocida IT/2022/00811/AUT

## ESCA RODENTICIDA IN BLOCCHI PARAFFINATI A BASE DI DIFENACOUM

### Composizione

100 g di prodotto contengono:

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Difenacoum                             | 0,005 g |
| Denatonio Benzoato (CAS 3734-33-6)     | 0,001 g |
| Sostanze appetibili e adescanti q.b. a | 100 g   |

### Formulazione

Blocco paraffinato estruso da 20 g

### Caratteristiche

pronta all'uso a base di una sostanza attiva anticoagulante, denominata Difenacoum, efficace contro topolino domestico, ratto grigio e ratto nero anche dopo una singola ingestione. La formulazione consiste in un blocco paraffinato, appetibile per le specie di roditori indicate, di colore verde e dalla forma rettangolare dal peso di 20 g con foro centrale, per permettere al blocco di essere fissato in maniera stabile. Inoltre, i particolari rilievi realizzati sui lati, stimolano il naturale comportamento dei roditori a rosicchiare. Il prodotto non allerta e non genera sospetti agli altri componenti della popolazione di roditori. Contiene una sostanza amaricante atta a prevenire l'ingestione accidentale da parte dei bambini. Può essere usato all'interno e intorno a edifici industriali (inclusi magazzini, depositi, stive delle navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli, giardini ed aree esterne di pertinenza.

BONITOP BLOCK PLUS esplica la sua azione per ingestione, dal momento che il Difenacoum è un anticoagulante di seconda generazione definito a "singola ingestione", poiché causa la morte dei roditori per emorragia interna nel giro di qualche giorno, anche a seguito di piccole assunzioni di esca, senza suscitare diffidenza nei consimili verso l'esca stessa, permettendo un'attività di disinfestazione continua e completa. Topi e ratti, una volta assunta l'esca, vengono presi da un senso di soffocamento e tendono ad andare a morire all'aperto. Il prodotto contiene anche una sostanza amaricante (Denatonio Benzoato) atta a ridurre il rischio di ingestione accidentale da parte di persone, in particolare bambini, animali domestici e non target; l'antidoto (Vitamina K1) risulta di facile reperibilità.

Prodotto ad uso specifico di professionale specializzato.

### Misure di mitigazione del rischio

Le esche rodenticide contenenti sostanze attive anticoagulanti (AVK) sono destinate ad un uso non permanente e in un'ottica di gestione integrata delle infestazioni. Nel caso in cui l'infestazione non sia completamente debellata nell'arco dei 35 giorni previsti dalla norma vigente, è tuttavia possibile per il professionista formato considerare un riutilizzo reiterato nel tempo delle esche rodenticide, in tutti quei luoghi con un elevato potenziale di re-invasione e qualora altri metodi di controllo si siano rivelati insufficienti.

Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull'etichetta del prodotto. Pertanto chi impiega il prodotto è tenuto a leggere e ad attenersi a quanto riportato in etichetta. PESTNET ITALIA srl declina ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma. Prima dell'uso si consiglia di effettuare una prova per testare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare.



PESTNET ITALIA srl

Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (PD)

Tel. 049|9500588

[www.pestnet-europe.it](http://www.pestnet-europe.it)

## Dosi e modalità d'impiego

Per un appropriato controllo delle infestazioni, attenersi alle seguenti fasi di trattamento:

### 1. Sopralluogo dell'area e pretrattamento

Prima di posizionare le esche accertarsi della presenza di roditori. Eseguire, quando possibile, eventuali monitoraggi, procedere ad un sopralluogo dell'area per stabilire la specie di roditori, il livello e l'estensione dell'infestazione ed individuare tutti i punti di accesso, le tane, i luoghi di alimentazione, ecc. Per i monitoraggi e in particolare per il controllo continuativo di aree sensibili e per minimizzare l'uso di esche rodenticide in industrie alimentari, magazzini stoccaggio di sostanze alimentari, ecc., è consigliabile utilizzare preventivamente trappole o esche non contenenti sostanze avvelenate (esche placebo). Per raggiungere un risultato ottimale del trattamento segnalare eventuali modifiche strutturali e ridurre la capacità portante dell'ambiente dove avverrà il trattamento.

### 2. Trattamento

Dopo aver ispezionato le aree infestate, creare punti esca di 50/100 g dove vi siano segni di presenza dei roditori, come ad esempio nei pressi di tane, lungo i loro camminamenti e punti d'alimentazione. Accertarsi sempre che le esche siano adeguatamente protette utilizzando adeguati erogatori a prova di manomissione

avendo cura di fissare stabilmente i blocchi al fine di impedirne la dispersione nell'ambiente o l'ingestione accidentale del prodotto da parte di bambini o altre specie non target. È buona norma segnalare i punti esca su mappa. Controllare le postazioni dopo 5/8 giorni dal primo posizionamento integrando le esche consumate

o cambiando dislocazione di quelle che non evidenziano nessun consumo. Durante le operazioni di caricamento e pulizia delle esche usare guanti protettivi. Durante il trattamento la zona interessata deve essere chiaramente segnalata. Per l'utilizzo in aree pubbliche segnalare presso ogni punto esca i rischi di avvelenamento primario o secondario con il prodotto e indicare le misure di primo soccorso. Al termine del trattamento ritirare e raccogliere le esche rimaste ed eliminarle secondo le normative vigenti.

Dosi di utilizzo:

- **Per infestazioni da ratti**
  - in caso di alta infestazione 60-100 g di prodotto per contenitore, pari a 3-5 esche da 20g;
  - in caso di bassa infestazione 40-60 g di prodotto per contenitore, pari a 2-3 esche da 20g.
- **Per infestazioni da topi**
  - 40 g di prodotto per contenitore, pari a 2 esche da 20 g.
- **Esca permanente:**
  - 60-100 g di prodotto per punto esca, pari a 3-5 esche da 20 g.

Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull'etichetta del prodotto. Pertanto chi impiega il prodotto è tenuto a leggere e ad attenersi a quanto riportato in etichetta. PESTNET ITALIA srl declina ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma. Prima dell'uso si consiglia di effettuare una prova per testare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare.



**PESTNET ITALIA srl**

Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (PD)

Tel. 049|9500588

[www.pestnet-europe.it](http://www.pestnet-europe.it)

## Confezioni di vendita

Cartone da 10 Kg



Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull'etichetta del prodotto. Pertanto chi impiega il prodotto è tenuto a leggere e ad attenersi a quanto riportato in etichetta. PESTNET ITALIA srl declina ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma. Prima dell'uso si consiglia di effettuare una prova per testare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare.



**PESTNET ITALIA srl**  
Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (PD)  
Tel. 049|9500588  
[www.pestnet-europe.it](http://www.pestnet-europe.it)